

Boga del Guadiana

Familia: Cyprinidae

Nombre Científico: *Pseudohondrostoma willkommii*




Descripción

La boga del Guadiana es morfológicamente muy similar a la boga de río: tiene un cuerpo alargado, con escamas pequeñas, boca ínfera, cornea y con un morro prominente. Se diferencian en el número de dientes faríngeos, que en la boga del Guadiana están en número de 7-6, aunque existen poblaciones con 6-6 dientes.

Hábitat

La boga vive en tramos medios de los ríos, habiéndose adaptado bien a los embalses, siempre que tengan buenas zonas de remonte, afluentes por los que sube para reproducirse. En los embalses puede alcanzar un mayor tamaño por tener más alimento disponible y mayores temperaturas en el agua. En cursos medios de los ríos es muy típico verla ocupando los correntones, las zonas de mayor velocidad de corriente.



Alimentación

Tiene una dieta principalmente fitófaga y detritívora, consumiendo principalmente algas, restos de fanerógamas y en menor medida invertebrados. Las fuertes oscilaciones de nivel de los embalses pueden afectar a las poblaciones de boga al incidir negativamente sobre las algas que recubren el sustrato

Especie autóctona

Boga del Guadiana

Familia: Cyprinidae

Nombre Científico: Pseudohondrostoma willkommii

Reproducción

Es el primer ciprínido en reproducirse, entre finales de marzo y mayo, cuando migran aguas arriba hacia zonas de fuerte corriente, poca profundidad y piedras pequeñas. Esto le permite reproducirse en lugares donde han desaparecido buena parte de los depredadores de huevos y alevines, sobre todo tras años de fuerte estiaje. Las hembras ponen de 1.000 a 15.000 huevos en uno o dos periodos de desove. Ambos sexos alcanzan la madurez sexual a los dos años de edad.



Estado de conservación y amenazas

Es una especie que está sufriendo cierta regresión, más acusada que la boga de río. Las causas de esta disminución de efectivos son similares a las de otras especies autóctonas: la introducción de peces exóticos, las extracciones de agua, las graveras, las barreras de infraestructuras, que fragmentan el hábitat de la boga, son los principales factores de amenaza para la boga del Guadiana.

Su pesca

Es uno de los peces más populares entre los pescadores de cebo natural sobre todo debido a la sutileza de su picada. Es necesario el empleo de aparejos muy livianos con hilos finos y anzuelos muy pequeños. El cebo más empleado por su eficacia es el "ver de vass". Es típica su pesca en los primeros meses del año cuando remonta los ríos preparándose para la freza.

Especie autóctona

Distribución geográfica Boga del Guadiana

La boga del Guadiana vive en las cuencas de los ríos Guadiana, Guadalquivir, Odiel y ríos del sur de España. Al igual que la boga de río, es un endemismo ibérico.

