Boga del Tajo o Boga común

Familia: Cyprinidae

Nombre Científico: Pseudochondrostoma polylepis

Descripción

La boga es un ciprínido de cuerpo alargado, con abertura bucal inferior bajo un morro prominente que es muy característico. Las aletas dorsal y anal son largas. Tiene escamas pequeñas. Los dientes faríngeos se presentan en número de 6-5. No existe dimorfismo sexual marcado.

Hábitat

La boga vive en tramos medios de los ríos y en aguas embalsadas siempre que tengan buenas zonas de remonte, afluentes por los que sube para reproducirse. Prefiere cursos de corriente moderada a fuerte. Durante la reproducción migra aguas arriba a medios con menor profundidad, de aguas bien oxigenadas y con fondos de textura intermedia como arenas y gravas, donde desova.



Alimentación

Se alimenta principalmente de algas, que raspa de las piedras gracias a su boca córnea, complementando la dieta con detritus. En los embalses en que vive, las oscilaciones del nivel de las aguas destruyen las algas que recubren las piedras, lo que afecta negativamente a las bogas.

Especie autóctona

Boga del Tajo o Boga común

Familia: Cyprinidae

Nombre Científico: Pseudochondrostoma polylepis

Reproducción

Alcanzan la madurez sexual a los dos años de edad. Tiene hábitos gregarios, que son más marcados durante la época de reproducción. Es el primer ciprínido en reproducirse, entre finales de marzo y mayo, cuando migran aguas arriba hacia zonas de fuerte corriente, poca profundidad y piedras pequeñas. La hembra pone de 1.000 a 8.000 huevos en dos periodos de desove.

Estado de conservación y amenazas

Las poblaciones de boga están sufriendo un cierto declive. Al igual que ocurre con otras especies autóctonas, la introducción de peces foráneos constituye una de las principales amenazas directas sobre la boga de río. Las extracciones de agua, las graveras, las barreras de infraestructuras, que fragmentan el hábitat de la boga, son amenazas que afectan a esta especie, son otras causas del declive de esta especie.

Su pesca

Es uno de los peces más populares entre los pescadores de cebo natural sobre todo debido a la sutileza de su picada. Es necesario el empleo de aparejos muy livianos con hilos finos y anzuelos muy pequeños. El cebo más empleado por su eficacia es el “ver de bas”. Es típica su pesca en los primeros meses del año cuando remonta los ríos preparándose para la freza.

Distribución geográfica Boga del Tajo o Boga común

La boga de río vive solamente en la cuenca del río Tajo y es muy similar a la boga del Guadiana de la que difiere básicamente por caracteres óseos difíciles de observar.