


Pseudorasbora

Pseudorasbora parva

Alóctono

Cyprinidae



Hábitat

Prefiere arroyos, ríos y lagunas de aguas templadas con abundante vegetación acuática aunque se adapta bien a gran variedad de hábitats. Muy resistente a condiciones adversas del medio.



Presencia



Origen y causas de la introducción

De origen asiático fue introducido de manera accidental a partir de la acuicultura junto a otras especies de ciprínidos traídos de Asia para acuariofilia.

Incluida entre las 100 especies invasoras más dañinas del mundo.
Es capaz de poner sus huevos sobre cualquier sustrato, incluso plásticos y embarcaciones, lo que facilita su dispersión.


Impacto sobre el medio y otras especies

Sus poblaciones se encuentran en alarmante expansión.

Compete con el resto de especies por el alimento y espacio además de depredar sobre sus puestas y alevines. Es portador de un parásito intracelular que inhibe la reproducción de otros ciprínidos e incluso puede llegar a provocar su muerte.

Reproducción

Alcanzan la madurez sexual muy temprano pudiendo duplicar la población en menos de 15 meses. La hembra prepara un nido donde deposita la puesta que posteriormente es cuidada por el macho hasta la eclosión de los alevines.



Rango de tallas del adulto